

Primeros Auxilios para las Emergencias Dentales

Siga las instrucciones a continuación cuando un niño tenga una emergencia dental.

- ★ En todos los casos tranquilice al niño.
- ★ Si hay sangre usted debe ponerse guantes.
- ★ No le de nada para aliviar el dolor hasta que sus padres sean consultados.

SANGRAMIENTO DESPUÉS QUE EL DIENTE DE LECHE SE CAIGA

- ✓ Doble y ponga una gasa, trapo, o paño limpio en el área que está sangrando.
- ✓ Haga que el niño muerda la gasa por 15 minutos. La presión puede ser repetida.
- ✓ Asegúrese que el niño no se esté levantando frecuentemente.
- ✓ Si el sangramiento continúa, vea a un dentista.

CUANDO SE ROMPEN LOS FRENILLOS Y LOS CABLES

- ✓ Los cables rotos pueden ser cubiertos con cera o con una gasa hasta que el niño pueda ser visto por un ortodontista.
- ✓ No remueva o quite los cables si están incrustados en la mejilla, lengua o encías.
- ✓ EL NIÑO DEBE VER A UN ORTODONTISTA INMEDIATAMENTE.

UN DIENTE ROTO

- ✓ Gentilmente limpie la suciedad o restos de el area lesionada.
- ✓ Presione la cara y la lesión con algo frío
- ✓ Si es posible consiga y guarde cualquier fragmento de diente.
- ✓ VEA AL DENTISTA INMEDIATAMENTE.

CORTADA O MORDEDURA DE LA LENGUA, LABIOS, O MEJILLA

- ✓ Limpie el area con un paño húmedo.
- ✓ Aplique presión con el paño para parar el sangramiento.
- ✓ Ponga hielo en la parte inflamada o herida. Si no para de sangrar después de 15 minutos o después de aplicar presión leve, el niño debe ser visto por un médico o dentista.

UN DIENTE PERMANENTE SE PIERDE POR UN GOLPE

- ✓ Encuentre el diente.
- ✓ Tómelo por la corona y no por la raíz
- ✓ Gentilmente ponga el diente en el orificio en donde estaba y sosténgalo en ese lugar.
- ✓ Un diente que rápidamente es puesto en su propio orificio tiene altas probabilidades de ser salvado.
- ✓ Si el diente no puede ser insertado en el orificio, póngalo en "Salve-un-Diente" o un vaso de leche. No ponga el diente en agua del grifo.
- ✓ VEA AL DENTISTA INMEDIATAMENTE.

POSIBLE FRACTURA DE LA QUIJADA

- ✓ La línea de la quijada puede verse deformada.
- ✓ Llame inmediatamente al servicio emergencia local márque el número telefónico (911).
- ✓ Mantenga al niño quieto y calmado.
- ✓ Asegúrese que el niño esté respirando.
- ✓ Trate de que la quijada no se mueva.

DOLOR DE MUELA

- ✓ Lávese la boca vigorosamente con agua con tibia sal para remover cualquier resto de comida o suciedad.
- ✓ No coloque una aspirina en el lugar del dolor porque puede causar quemaduras en la encía. Si la cara está inflamada ponga, presión con algo frío por la parte externa de la mejilla.
- ✓ Dígale a los padres que deben llevar al niño al dentista tan pronto como sea posible.



NC

Public Health
HEALTH AND HUMAN SERVICES